

OptoRelease آپتورلیز

منبع اوره آهسته رهش برای نشخوارکنندگان

ترکیبات	حداقل ۴۰٪	نیتروژن
اوره، روغن های گیاهی، بتاکاروتن، اسید سیتریک	۲۵۰٪	معادل پروتئینی
	حداکثر ۲٪	میلن دی یوریا MDU
	۱٪	رطوبت

دستورالعمل مصرف:

- آپتورلیز بایستی به میزان ۱۷۰ گرم به ازای هر راس در روز مورد مصرف قرار بگیرد.
- میزان مصرف آپتورلیز به صورت درصد از ماده خشک جیره ۰/۸۵ درصد خواهد بود.
- برای حصول نتیجه بهینه مدت ۲ تا ۴ هفته دوره عادت پذیری در نظر گرفته شود.
- بیش از یک سوم از پروتئین کل چیره نبایستی از منابع نیتروژن غیر پروتئینی تامین شود.
- به همزاه سایر منابع غنی از نیتروژن غیر پروتئینی مصرف نشود.
- میزان مصرف اوره از ۰/۳ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بیشتر نشود.
- به گوساله های زیر سه ماه تغذیه نشود.
- حتما با نظر متخصص تغذیه و همراه با مقادیر کافی از منابع کربوهیدرات سریع التخمیر مصرف شود.